


## Nunca es tarde para beneficiarse con el tratamiento para disminuir los lípidos<sup>(1)</sup>



En un grupo de habitantes entre 20 y 100 años que no tomaban estatinas o que tuvieran diabetes. En esta población, la elevada concentración del LDL estuvo relacionada con aumentado riesgo de infarto del miocardio y enfermedad cardiovascular ateromatosa en aquellos mayores de 70 años fue menor que en los individuos jóvenes.

Estos hallazgos soportan el concepto de la carga acumulativa de LDL en nuestra vida y el riesgo progresivo de enfermedad cardiovascular, incluyendo los infartos con la edad.

Estos hallazgos indican que se debería estimular el uso de drogas que disminuyen los factores de riesgo en los ancianos.

*Rolando Calderón-Velasco*

1. Baal FS, Farzahana VL. The Lancet Vol. 326, November 21th, 2020.

**Citar como:** Calderón-Velasco R. Revista de Revistas. Nunca es tarde para beneficiarse con el tratamiento para disminuir los lípidos. Diagnóstico(Lima).2020;59(3):166.

**DOI:** 10.33734/diagnostico.v59i3.244

**Correspondencia:** Rolando Calderón Velasco. **Correo electrónico:** rocalve@gmail.com



**FUNDACIÓN INSTITUTO HIPÓLITO UNANUE**  
•fihu-diagnostico@alafarpe.org.pe •www.fihu.org.pe